

PAKKAUSSELOSTE

Aspirin Cardio 100 mg enterotabletti asetyylisalisyylihappo

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Aspirin Cardio -enterotabletteja huolellisesti saadaksesi siitä parhaan hyödyn.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen.
- Kysy apteekista tarvittaessa lisätietoja ja neuvoja.
- Ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi pahenevat tai ne eivät lieviy.
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus (ks. kohta 4) on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tässä pakkausselosteessa esitetään:

1. Mitä Aspirin Cardio on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat Aspirin Cardio -enterotabletteja
3. Miten Aspirin Cardio -enterotabletteja käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Aspirin Cardio -enterotablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

1. MITÄ ASPIRIN CARDIO ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletteja käytetään estämään verisuonitukosten syntymistä, etenkin sydämen ja aivojen verisuoniin. Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletteja voidaan käyttää sydäninfarktin ensiapuna.

Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletti sisältää vaikuttavana aineena asetyyylisalisyylihappoa. Asetyyylisalisyylihappo kuuluu salisylaattiryhmään ja sitä käytetään kipu-, särky- ja kuumelääkkeenä sekä lievittämään tulehduskipuun liittyvää turvotusta. Asetyyylisalisyylihapon on todettu jo pienempinä annoksina vaikuttavan myös veren hyytymisominaisuuksiin ja ehkäisevän veritulppien syntymistä mm. sydämen ja aivojen verisuoniin. Vaikutuksensa vuoksi Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletteja käytetään verisuonitukosten syntymistä estävänä lääkkeenä. Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletit on päällystetty kalvolla, joka ei liukene mahassa vaan vasta ohutsuolessa. Siksi asetyyylisalisyylihappo vapautuu enterotabletista myöhemmin kuin tavallisesta, päällystämättömästä tabletista. Toimintaperiaatteensa vuoksi enterotabletti aiheuttaa vähemmän ruoansulatuskanavan ärsytystä kuin tavallinen tabletti.

2. ENNEN KUIN OTAT ASPIRIN CARDIO -ENTEROTABLETTEJA

Älä ota Aspirin Cardio -enterotabletteja

- jos olet allerginen (yliherkkä) vaikuttavalle aineelle tai Aspirin Cardio -enterotablettien jollekin muulle aineelle tai muille samantyyppisille kipu- ja tulehduslääkkeille (salisylaateille)

Hoitavalle lääkärille tulisi kertoa muista todetuista sairauksista ennen lääkeshoidon aloittamista, sillä Aspirin Cardio -enterotabletteja ei tulisi käyttää:

- jos sinulla on taipumusta verenvuotoihin (esim. verenvuototauti eli hemofilia)
- jos sinulla on tai on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava
- jos sinulla on tai on ollut maksan, munuaisten tai sydämen vajaatoiminta
- jos olet saanut astmakohtauksen salisylaateista tai muista tulehduskipulääkkeistä
- jos käytät metotreksaattia viikossa yli 15 mg tai enemmän.

Lääkettä ei suositella käytettäväksi raskauden aikana, eikä sitä saa käyttää raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana.

Ole erityisen varovainen Aspirin Cardio -enterotablettien suhteen

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää kertoa hoitavalle lääkärille muista todetuista sairauksista samoin kuin mahdollisesta raskaudesta jo **ennen** hoidon aloittamista. Aspirin Cardio -enterotablettien käytössä tulisi noudattaa varovaisuutta ja tarvittaessa tulee kääntyä lääkärin puoleen, jos:

- käytät samanaikaisesti veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariini ja muut kumariinijohdannaiset tai hepariini); näiden lääkkeiden vaikutukset voivat voimistua Aspirin Cardio -enterotablettien käytön yhteydessä
- sinulla on todettu sydän-, maksa- tai munuaissairauksia. Tulehduskipulääkkeiden tavoin valmiste voi lisätä turvotustaipumusta sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.
- sinulla on pitkäaikaisia tai toistuvia ruoansulatuskanavan sairauksia
- olet saanut allergisia oireita (esim. astmakohtauksen, ihottumia, allergista nuhaa) muista tulehduskipu- tai reumalääkkeistä
- sinulla on tai on ollut astma tai pitkäaikaisia hengitystiesairauksia
- sinulla on harvinainen glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasipuutos
- sinulla on ollut kihti. Asetyyლისისყლიჰოპო saattaa pieninä annoksina laukaista kihtikohtauksen, jos sinulla on taipumusta kihtiin.

Sinun tulee kertoa lääkärille Aspirin Cardio -enterotablettien ja muiden asetyylისისყლიჰოპოvalmisteiden käytöstä, jos menet leikkaukseen. Lääkkeen käyttö joudutaan ehkä lopettamaan useita päiviä ennen suunniteltua leikkausta.

Jos lääkkeen käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, tulee kääntyä lääkärin puoleen.

Asetyyლისისყლიჰოპოvalmisteita ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille ja nuorille, koska virussairauksien (esim. flunssa, vesirokko) yhteydessä ne saattavat lisätä vakavan Reyen oireyhtymän vaaraa. Sen ensioireita on mm. pitkään jatkuva oksentelu.

Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Aspirin Cardio -enterotabletteja käytetään samanaikaisesti tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa.

Keskustele hoitavan lääkärin kanssa ennen kuin käytät Aspirin Cardio -enterotablettien kanssa samanaikaisesti

- veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariini ja muut kumariinijohdannaiset tai hepariini)
- suun kautta tai ruiskeena annosteltavia kortisonivalmisteita. Aspirin Cardio -enterotablettien ja kortisonivalmisteen samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.
- muita samankaltaisia tulehduskipulääkkeitä
- selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (ns. SSRI), joita käytetään esim. masennuslääkkeinä
- tiettyjä diabeteslääkkeitä (esim. insuliini, glibenklamidi, glipitsidi)
- metotreksaattivalmisteita (käytetään mm. nivelreumassa ja tietyissä kasvainsairauksissa)
- sulfonamideja (sulfat) sisältäviä antibioottivalmisteita
- digoksiinia (sydänlääke)
- epilepsialääkkeitä (barbituraatit kuten fenobarbitaali, fenytoiini, natriumvalproaatti)
- litiumia sisältäviä lääkkeitä (käytetään mm. mielialahäiriöiden hoidossa)
- nesteenpoistossa käytettäviä lääkkeitä (esim. spironolaktoni, furosemidi)
- virtsahapon eritystä lisääviä kihtilääkkeitä (probenesidi)
- tietyt verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät ja angiotensiini II-salpaajat).

Aspirin Cardio -enterotablettien ja alkoholin samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa.

Raskaus ja imetys

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.

Valmiste kuuluu lääkeryhmään (tulehduskipulääkkeet), joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemistä. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen.

Aspirin Cardio -enterotablettien, kuten muidenkaan salisylaatteja sisältävien lääkevalmisteiden käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana eikä saa käyttää raskauden kolmen viimeisen kuukauden aikana. Raskauden aikaisesta hoidosta tulisi aina neuvotella lääkärin kanssa.

Asetyyylisalisyylihappo erittyy äidinmaitoon pieninä määrinä. Vaikka satunnaisesti otettujen pienten annosten ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia lapselle, tulisi imetyksen aikaisesta lääkkeen käytöstä aina neuvotella lääkärin kanssa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Aspirin Cardio 100 mg -enterotablettien ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.

3. MITEN ASPIRIN CARDIO -ENTEROTABLETTEJA KÄYTETÄÄN

Annostus

Verisuonitukosten estohoito aloitetaan lääkärin aloitteesta ja ohjauksessa. Tavallisesti käytetty annos on 100 - 300 mg vuorokaudessa (1 - 3 Aspirin Cardio 100 mg -enterotablettia vuorokaudessa).

Sydäninfarktin ensiapuna tulee ottaa 2-3 tablettia (200-300 mg) pureskelemalla tai murskaamalla tabletit imeytymisen nopeuttamiseksi. Ensiapuna sydäninfarktissa suositellaan tavanomaista ei-suolistoliukoista asetyylisalisyylihappovalmistetta.

Aspirin Cardio 100 mg -enterotabletit on tavallisesti nieltävä **kokonaisina** runsaan nesteen kanssa.

Jos otat enemmän Aspirin Cardio -enterotabletteja kuin sinun pitäisi

Yliannostus- ja myrkytystapauksissa on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin, lähimpään sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. (09) 471 977).

Jos unohdat ottaa Aspirin Cardio -enterotabletin

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikki lääkkeet, Aspirin Cardio -enterotabletitkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Lääkkeen haittavaikutuksina voi esiintyä erilaisia ruoansulatuskanavan oireita, kuten vatsakipua, närästystä, pahoinvointia, ripulia ja oksentelua. Joissakin harvinaisissa tapauksissa saattaa syntyä ruoansulatuskanavan haavaumia, joihin voi liittyä verenvuotoa (voi ilmetä mustina veriulosteina ja verioksennuksina). Enteropäälysteisen tabletin aiheuttamat ärsytysoireet ovat kuitenkin vähäisemmät kuin tavallisella päällystämättömällä tabletilla. Koska asetyylisalisyylihappo vaikuttaa veren hyytymisominaisuuksiin, haavat voivat vuotaa tavallista pitempään.

Verenvuotoja, kuten leikkaukseen liittyvää verenvuotoa, verenpurkauksia, nenäverenvuotoa, virtsa- ja sukupuolielimiin liittyvää verenvuotoa ja ienverenvuotoa voi esiintyä. Verenvuodot voivat joissakin tapauksissa olla vakavia.

Verenvuoto voi johtaa anemiaan/raudanpuutosanemiaan.

Joskus voi esiintyä allergisia oireita, kuten ihottumaa, allergista nuhaa tai astmaa.

Yksittäisissä tapauksissa on esiintynyt häiriöitä maksan tai munuaisten toiminnassa, verensokerin laskua ja muutoksia verihiutaleiden määrässä.

Potilailla, joilla on vaikea glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasipuutos, on esiintynyt punasolujen hajoamista ja siitä johtuvaa hemolyyttistä anemiamia.

Yliannostuksen oireina voi esiintyä myös huimausta ja korvien soimista, erityisesti lapsilla ja vanhuksilla. Tällaisissa tapauksissa tulee käännyä lääkärin puoleen.

Aspirin Cardio -enterotablettien käytön yhteydessä mahdollisesti esiin tulevat haittavaikutukset tulee ilmoittaa lääkärille (tai apteekkiin).

5. ASPIRIN CARDIO -ENTEROTABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytä alle 25 °C. Herkkä kosteudelle.
Säilytä alkuperäispakkauksessa.

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. MUUTA TIETOA

Mitä Aspirin Cardio -enterotabletti sisältää

- Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo. Yksi enterotabletti sisältää 100 mg asetyylisalisyylihappoa.
- Muut aineet ovat selluloosajauhe ja maissitärkkelys. Kalvopäällyste: metakryylihapo-etyyliakrylaattikopolymeeri, natriumlauryylisulfaatti, polysorbaatti 80, talkki, trietyylisitraatti.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Valkoinen, pyöreä kalvopäällystetty enterotabletti.
Pakkaus: 98 tai 100 tablettia läpipainopakkauksessa.

Myyntiluvan haltija

Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku.

Valmistaja

Bayer Bitterfeld GmbH, Ortsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen, Saksa.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Bayer Oy, PL 73, 02151 Espoo. Puhelin 020 78521.

Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi

3.8.2011

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter acetylsalicylsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Aspirin Cardio måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Aspirin Cardio är och vad det används för
2. Innan du tar Aspirin Cardio enterotabletter
3. Hur du använder Aspirin Cardio enterotabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Aspirin Cardio enterotabletter ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD ASPIRIN CARDIO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter används för att förhindra blodproppsbildning särskilt i hjärtats och hjärnans blodkärl. Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter kan användas som förstahjälp vid hjärtinfarkt.

Det verksamma ämnet i Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter är acetylsalicylsyra.

Acetylsalicylsyra tillhör gruppen salicylater och används som ett läkemedel vid smärta, värk och feber samt för att lindra svullnad relaterad till inflammatoriskt betingad smärta. Acetylsalicylsyra har redan i mindre doser konstaterats påverka även blodets koagulationsförmåga och förhindra uppkomsten av blodproppar bl.a. i hjärtats och hjärnans blodkärl. På grund av sin effekt används Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter som ett läkemedel för att förebygga blodproppsbildning. Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter är dragerade med en film som löser upp sig först i tunntarmen, inte i magen. Följaktligen frisätts acetylsalicylsyra senare från enterotabletter än från vanliga, odragerade tabletter. På grund av sin verkningsmekanism framkallar enterotabletter mindre irritation i mag-tarmkanalen än konventionella tabletter.

2. INNAN DU TAR ASPIRIN CARDIO ENTEROTABLETTER

Ta inte Aspirin Cardio enterotabletter

- om du är allergisk (överkänslig) mot aktiv substans eller något av övriga innehållsämnen i Aspirin Cardio eller andra likartade smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel (salicylater).

Den vårdande läkaren bör informeras om andra samtidigt sjukdomar innan läkemedelsbehandling inleds, eftersom Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter inte skall användas:

- om du har ökad blödningsbenägenhet (t.ex. blödarsjuka, dvs. hemofili)
- om du har eller har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen
- om du har eller har haft leversvikt, njursvikt eller hjärtsvikt.
- om du har fått astmaanfall av salicylater eller andra antiinflammatoriska läkemedel
- om du använder 15 mg eller mera metotrexat per vecka.

Läkemedlet rekommenderas inte under graviditet, och det får inte användas under graviditetens tre sista månader.

Var särskilt försiktig med Aspirin Cardio

För att behandlingen skall vara framgångsrik är det viktigt att du redan **innan** behandlingen inleds informerar den vårdande läkaren om andra sjukdomar som konstaterats hos dig samt om du är gravid. Vid användning av Aspirin Cardio enterotabletter skall försiktighet iakttas och läkare vid behov rådfrågas i följande fall:

- Om du samtidigt använder läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin, andra kumarinderivat eller heparin); effekterna av dessa läkemedel kan förstärkas vid samtidigt intag av Aspirin Cardio enterotabletter
- Om du har konstaterats lida av en hjärt-, njur- eller leversjukdom. Liksom antiinflammatoriska analgetika, kan detta läkemedel predisponera för ödem hos patienter med hjärt- eller njursvikt.
- Om du har haft långvariga eller återkommande sjukdomar i mag-tarmkanalen
- Om du har fått allergiska symtom (t.ex. astmaanfall, eksem, allergisk snuva) av andra antiinflammatoriska värkmedel eller antireumatiska läkemedel
- Om du har eller har haft astma eller långvariga luftvägssjukdomar
- Om du har det sällsynta tillståndet glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist
- Om du har haft gikt. I låga doser kan acetylsalicylsyra utlösa giktanfall, om du har benägenhet för gikt.

Du bör berätta för din läkare om användning av Aspirin Cardio enterotabletter eller andra acetylsalicylsyrapreparat om du ska opereras. Användning av medicinen måste kanske avbrytas flera dagar före den planerade operationen.

Om problem relaterade till användning av läkemedlet uppstår, bör den vårdande läkaren kontaktas.

Preparat som innehåller acetylsalicylsyra rekommenderas inte som förstahandsmedel vid feber hos barn och ungdomar, eftersom dessa läkemedel i samband med virusinfektioner (såsom influensa och vattkoppor) kan öka risken för den allvarliga Reyes sjukdomen. Tidiga symtom är bl.a. långvariga kräkningar.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Läkemedelsbehandlingens verkningar och effekt kan påverkas om Aspirin Cardio enterotabletter tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Rådgör med den vårdande läkaren innan du tillsammans med Aspirin Cardio enterotabletter intar:

- läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin och andra kumarinderivat eller heparin)

- kortisonpreparat som tas peroralt eller ges som injektion. Samtidig användning av Aspirin Cardio enterotabletter och kortison kan ge ökad risk för blödning i mag-tarmkanalen.
- andra jämförbara inflammationshämmande värkmedel
- selektiva serotoninåterupptagshämmare (s.k. SSRI) som används t.ex. mot depression
- vissa diabetesmedel (t.ex. insulin, glibenklamid, glipizid)
- metotrexatpreparat (som bl.a. används vid reumatoid artrit och vissa tumörsjukdomar)
- antibiotika som innehåller sulfonamider (sulfa)
- digoxin (en hjärtmedicin)
- antiepileptika (barbiturater såsom fenobarbital, fenytoin, natriumvalproat)
- läkemedel som innehåller litium (används bl.a. vid behandling av depressionstillstånd)
- urindrivande medel (t.ex. spironolakton, furosemid)
- giktmedel som ökar utsöndringen av urinsyra (probenecid)
- vissa blodtrycksmediciner (ACE- och angiotensin II-hämmare).

Aspirin Cardio enterotabletter i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Produkten hör till en grupp av läkemedel (NSAIDs), som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Påverkan är reversibel, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Liksom andra läkemedel som innehåller salicylater rekommenderas Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter inte under graviditet. Aspirin Cardio 100 mg får inte används under de tre sista graviditetsmånaderna. Behandling under graviditet bör alltid diskuteras med läkare.

Acetylsalicylsyra utsöndras i små mängder i modersmjölken. Fastän tillfälligt intag av små doser inte har visats medföra skadeverkningar på barnet, bör läkare alltid rådfrågas om användning av läkemedlet under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter har inte konstaterats påverka skadligt körförmågan eller användningen av maskiner.

3. HUR DU ANVÄNDER ASPIRIN CARDIO ENTEROTABLETTER

Dosering

Profylaktisk behandling av blodproppar inleds av läkare och ges under läkaruppsikt. Normaldosen är 100 - 300 mg per dygn (1 - 3 Aspirin Cardio 100 mg enterotabletter per dygn).

Som förstahjälp vid hjärtinfarkt bör man ta 2-3 tabletter (200-300 mg) genom att tugga eller krossa tabletterna för att påskynda upptagningen. Som förstahjälp vid hjärtinfarkt rekommenderas vanliga icke-tarmlösliga acetylsalicylsyrapreparat.

Aspirin Cardio 100 mg enterotabletterna skall vanligen sväljas **hela** tillsammans med en riklig mängd vätska.

Om du har tagit för stor mängd av Aspirin Cardio enterotabletter

Vid fall av överdosering och förgiftning bör en läkare, närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. (09) 471 977) kontaktas utan dröjsmål.

Om du har glömt att ta Aspirin Cardio enterotabletten

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Aspirin Cardio enterotabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Under läkemedelsbehandling kan varierande symtom från mag-tarmkanalen uppträda, såsom magont, halsbränna, illamående, diarré och kräkningar. I sällsynta fall kan blödande sår i mag-tarmkanalen uppstå (kan yttra sig som mörkfärgad avföring och blodkräkning). Dragerade enterotabletter framkallar emellertid mindre retningssymtom än konventionella, odragerade tabletter. Eftersom acetylsalicylsyra påverkar blodets koagulationsförmåga kan sår blöda längre än vanligtvis.

Blödningar såsom postoperativ blödning, hematom, näsblödning, blödning i urinvägar och könsorgan och blödande tandkött kan uppträda. I vissa fall kan blödningarna vara allvarliga. Blödning kan orsaka anemi/järnbrist.

Överkänslighetssymtom, t.ex. hudutslag, allergisk snuva eller astma, utvecklas stundom.

I enstaka fall kan störningar i lever- eller njurfunktionen, minskad blodsockerhalt och ändringar i mängden av blodplättar förekomma.

Hos patienter med svår glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist har hemolys och hemolytisk anemi förekommit.

Symtom på överdosering kan yttra sig som yrsel och öronsusningar, särskilt hos barn och äldre. I dessa fall bör läkare kontaktas.

Biverkningar som eventuellt framkommer vid användning av Aspirin Cardio enterotabletter skall rapporteras till läkaren (eller till apotekspersonal).

5. HUR ASPIRIN CARDIO ENTEROTABLETTER SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25°C. Fuktkänsligt.

Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra. Varje enterotablett innehåller 100 mg acetylsalicylsyra.
- Övriga innehållsämnen är cellulosapulver, majsstärkelse. Filmdragering: metakrylsyra-etylakrylatkopolymer, natriumlaurylsulfat, polysorbat 80, talk, trietylцитrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, runda, filmdragerade enterotabletter.

Förpackning: 98 eller 100 tabletter i en tryckförpackning.

Innehavare av försäljningstillstånd

Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo.

Tillverkare

Bayer Bitterfeld GmbH, Ortsteil Greppin, Bitterfeld-Wolfen, Tyskland.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Bayer Oy, PB 73, 02151 Esbo. Telefon 020 78521.

Denna bipacksedel godkändes senast

3.8.2011